

クリステンセン氏: ヤブソテツ屬 The genus *Cyrtomium* [American Fern Journal, XX, no. 2, p. 41—52 (1930)]

ヤブソテツ屬 *Cyrtomium* は *Polystichum falcatum* Diels オニヤブソテツを基本として建設された屬であるが、キノデ屬 *Polystichum* とはその脈序以外に著しい差はない。著者は先ず *Cyrtomium* を網状脈を有して一乃至數列の areola (脈間隙) を作り、各一乃至三個の遊離小脈を含むもの限定して、次の9種を記載してゐる。

1. *Cyrtomium Hookerianum* (PRESL) C. Chr., comb. nov.
東部ヒマラヤ、支那(雲南)
2. *C. Tachiroanum* (LUERSS.) C. Chr., comb. nov. ホソバヤブソテツ
九州南部、臺灣
田代安定氏が薩摩國紫尾山で採集した物に就き、LUERSSEN 氏が *Polypodium Tachiroanum* LUERSS. と命じたもので、臺灣の *Polystichum integripinnum* HAYATA タイワンクソソングユはその異名である。
3. *C. vittatum* CHRIST
支那南部(福建、廣東、雲南)、トンキン、日本(宮島)
Polystichum miyajimense KODAMA ミヤジマシダはその異名である。
4. *C. hemionitis* CHRIST
支那(貴州)
5. *C. nephrolepioides* CHRIST
支那(貴州)
6. *C. falcatum* (L. fil.) PRESL オニヤブソテツ
日本、朝鮮、臺灣、支那
7. *C. Fortunei* J. SM. ヤブソテツ
日本、支那
8. *C. lonchitoides* CHRIST
支那
9. *C. caryotideum* (WALL.) PRESL メヤブソテツ
ヒマラヤ、支那、日本、ハワイ、印度南部
var. *aequibasis* C. Chr., var. nov.
支那(雲南)
var. *intermedia* (DIELS) C. Chr., comb. nov.
支那、ヒマラヤ
var. *micropteris* (KUNZE) C. Chr., comb. nov.
印度、マダガスカル、アフリカ東部、南部 (田川基二)