

の新種は *Carex phaeothrix*; イワナルコスゲ、*C. ochrochlamys*; ヒメホスゲ、*C. atroviridis*; ヤクシマスゲ、*C. sozusensis*; ヤチアゼスゲ、*C. tumidula*, *C. fusco fibrosa*; ヒエスゲ、*C. senanensis*; ホスゲ、*C. impura*; ヒルゼンスゲ、*C. cuneata*; ミチノクホンモンヂスゲ、*C. praestabilis*; ツルカミカワスゲ、*C. ouensanensis*, *C. graciliculis*; ムシヤスゲ、*C. Otayai*; ナガエスゲ、*C. Yoshinoi*; ムラサキヒメカンスゲ等で、新名並びに新組合には、スナヂスゲ; *C. glabrescens*, ツルシバスゲ; *C. subbracteata*, ウスイロスゲ; *C. accrescens*, コアゼスゲ; *C. Koidzumiana* 等がある。終りに第一編及び續編の總目録がつけてある。(北村四郎)

山本由松氏:—續臺灣植物圖譜第五輯、〔臺灣總督府中央研究所林業部特別報告〕 (Y. YAMAMOTO: *Supplementa Iconum Plantarum Formosanarum Pars quinta*, published by the Department of Forestry, Government Research Institute, Taihoku, April 1932).

本圖譜第五輯には、*Carpinus Sekii*; タイワンアカシデ (cum fig.), *C. hebestroma* タロコシデ (cum fig.), *C. rankanensis* var. *Matsudae*; ホソミノランカンシデ (cum fig.), *Illicium daibuense*; ホソバシキミ (cum fig.), *Plantago Sawadai*; カワリオホバコ、*Valeriana nokozanensis*; ノウコウカノコサウを新しく發表され、嘗つて臺灣博物學會報に發表された、*Aconitum Bartlettii*; シマトリカブト (cum Tab), *Clematis Bartlettii*; オホタイワンボタンズル (cum fig.), *Crawfordia cordifolia*; アオイツルリンドウ (cum Tab.), *Euphrasia nankotaizanensis*; タイザンコゴメグサ (cum Tab.), *Corylopsis Matsudai*; シマミズキ (cum fig.) の記載文及び精細な圖版を附し、*Amentotaxus argotaenia* Pilger; ウラジロマキに関する精しい記載と圖が載せられてある。其の他多數の重要な新見解、新産地を報ぜられてゐる。本圖譜はこの號にて終り、末には學名並びに和名の索引が付してある。尙同氏の研究は今後熱帯農學會報に *Observationes ad Floram Formosanum* の題名の下に連載される由である。(北村四郎)

岡田喜一氏:—臺灣紅頭嶼の淡水藻類 Y. OKADA: *The Freshwater Algae of Botel Tobago Island or Kôtôsho, Formosa* (The Bulletin of the Biogeographical Society of Japan, Vol. III, No. 1 p.p. 36—63, pl. II—V, June 1932).

此論文には綠藻類9科55種、藍藻類5科17種が發表されそのうち新種3新變種4が記載されてゐる。材料は1929、1930年四月の採集である。此報告によつて日本の淡水藻