

た。従つてヌマドゼウツナギには *Glyceria spiculosa* ROSHEV. が正しい。此の理由からして内地のヌマガヤに *spiculosa* の種名は用ふる事が出来ぬのでやはり従來の *japonica* の名に逆もどりせねばならなくなつてしまつた。

ホソバヤブラン

大井次三郎

先頃臺灣に旅行したとき臺北の近くにある七星山に登つた事がある。そのときに附近の植物數種を生きたまゝで京都に送り、當教室で栽培して居たものゝ内に内地のヒメヤブランに似て葉が細長く、花序が長くて花數も多い違つたものがあつた。本年開花したので新種として記載する。

Liriope angustissima OHWI sp. nov. — Perennis, foliis sesqui-bipedalibus atrovirentibus rigidulis angustissime linearibus 1.5–2.5 mm latis confertis, apice sensim angustatis, supra elevato-tricostatis, subtus 5–8-nervis, margine superne scaberulis, basi vix angustatis, scapo ex foliorum fasciculo solitario ca. pedali erecto tenui compresso-ancipiti laevi 1 mm paulo latiore nudo, spica 5–10 cm longa densiuscule pluriflora, axi angulato laevi, bracteis late ovatis hyalinis ca. 1.5 mm longis sordide albidis, e dorso viridi aristatis, floribus 2–5-nis patentibus, pedicello 2–3 mm longo gracili, supra medium articulato, basi bracteola orbiculata membranacea uninervi praedito, perianthii segmentis 6, patentibus ellipticis ca. 2 mm longis membranaceis sordide azureis obsolete uninervis, margine alboscariosis, apice obtusissimis, staminibus 6, filamentis pallide azureis subulatis 1 mm longis globosis, antheris flavis glabris oblongis quam filamenta parum brevioribus, ovario depresso globoso, stylo staminibus aequilongo lineari tereti sursum curvato, stigmatibus truncato. — Hab. *Formosa*: m. Shichi-seizan in Taihokushu (J. OHWI, cultivated in the Botanical Institute, Kyoto Imper. Univers.).

家菊の原種に關する植物分類學者の見解

北村四郎

家菊の原種に關しては古來多くの見解があり、近年に於てもこの問題は興味を持たれ、この方面に貴重な研究が追加された。

こゝに述べるのは分類學者の諸説で、主として LINNAEUS氏以後現在に至るまでの