

Hab. Honsyû, Sikoku et Kyûsyû.

ウラジロヨシノヤナギ

小 泉 源 一

近畿地方より中國にはヨシノヤナギ (*Salix Yoshinoi* Koidz.) に似て葉裏の灰白色なる一種あり、之從來吉野善介氏はヨシノヤナギと混同しありしものにて新にウラジロヨシノヤナギの名を得たり。

***Salix pseudoyoshinoi* Koidz. nov. sp.**

Species nova *Salix Yoshinoi* Koidz. affinis sed foliis infra glaucis jam distinguenda.

Arbor ramis novellis lanuginoso-tomentosis, hornotinis pubescentibus purpureo-brunnescentibus; annotinis fere glabris vel partim puberulis fere castanaceis vel brunnescentibus interdum subnitidiulis; vetustioribus epidermide secedente griseo-obtectis. Folia adulta subchartacea vel crasse membranacea lanceolata 4–8 cm longa, 14–20 mm lata, apice vulgo acuta raro acuminata, basi pleraque rotundata interdum obtusissima, margine denticulis glanduliferis instructa, novella superne laxius infra densius adpresse villosula, costa media utrinque adpresse villosa-tomentosa, adulta etiam nondum glaberrima, supra intense sed satis obscure viridia, infra glauca, costa media supra paullo subtus satis elevata, costulis secundariis utrinque 17–33 prominulis, arcuatis subirregulariter ascendentibus, ceterum satis distincte tenuiter reticulata; petiolis brevibus 2–4 mm longis superne sulcatis basi leviter dilatatis dense lanuginosis mox pilosulis; stipulis semiovatis acutis glanduloso-dentatis pilosis. Amenta tantum feminea visa, pedunculis 6–8 mm longis basi foliis obovatis villosis parvis suffulta, cylindrica subdensiflora, sub anthesi circiter 12–14 mm longa, 4–5 mm lata; ovaria ovoidea dense subsordide villosa-tomentosa, sessilia, stylo glabro quam stigmata revoluta facie dense minutissime papillosa paullo longiora; bractee ovatae vel elliptico-ovatae obtusae brunnescentes sericeo-villosulae extus ad apicem glabrescentes; glandula 2, ventralis ovato-triangularata apice truncata, dorsalis minutissima glabra.

Nom. Jap. *Urajiro-yoshinoyanagi*

Hab. Japonia: prov. Bittiu, Matsuyamamura, Awoki (lg. Z. YOSHINO ! fl. 10, April. fol. 13, Jull. 1926.)