

## 沖繩産弟切草新品

小 泉 源 一

昭和七年五月八日沖繩島の多和田眞淳氏は美里村松本にて弟切草の一種(No. 122)を採れり、本品は葉の黒點が周圍ぼかして美しい點で *Hypericum Nakaianum* LEVL (= *H. Taquetii* KELLER) や *Hypericum Dielsii* LEVL に類し、萼片が線狀で黒紫色を呈し先端鈍頭なる點でも亦前者に似品なるが本品は遙に壯大にして普通の弟切草の如く、且つ雌蕊下に腺體を有せざるを以て區別すべく、後者とは葉は卵圓下面灰白ならざる事萼片銳形ならざる事にて直に區別し得べし。

***Hypericum* (Homotaenium) *lutchuense* KOIDZ. nov. sp.**

Herbae perennantes 60-65 cm altae, robustae, inferne breviter nodosae, 3-5 mm latae, glaberrimae. Caulis erectus simplex, e nodo ramis brevibus sterilibus vel longis fertilibus duobus instructus; internodiis quam folia brevioribus inferioribus valde abbreviatis copiose articulatis, lineis infrapetio-  
laribus paullum elevatulis. Folia dicussatim opposita oblonga, ovato-oblonga vel oblongo-ovata, apice emarginata basi pleraque subcordato-amplexicaulis raro obtusissima, integerrima, 2,5-4 cm longa, 8-14 mm lata, utrinque 2-4 costata, facie punctis orbicularibus centro atratis margine pulchre atro-coeruleis picta, margine nigro-punctata, tenue chartacea vel crasse membranacea, costis venisque infra elevatulis supra impressiusculis. Inflorescentia ad apicem caulis copiose subpaniculatim florata, bracteis bracteolisque foliaceis oblongis vel lineari-oblongis oppositis, pedicellis filiformibus clavatis, floribus lutescentibus. Calyx sepala lineari-oblonga vel oblonga obtusa atro-purpurascens striata, inter linam margineque nigro-punctata, raro margine glandulis nigris stipitatis vestita. Petala obovato-oblonga tenuissima nervosa, inter venam nigrostriata, margine atropunctata vel glandulosa. Stamina tridelpha. Carpella 4 ovaria inter se coalita stylis liberis rectis rubris.

Nom. Jap. *Okinawa-otogiri*

Hab. Japonia: Lutchuu, insula Utchina (lg. S. TAWADA, 1932 Maj. 8.)

日 本 植 物 覺 書 1

(*Sertum Japonicum* 1, auct. J. OHWI)

大 井 次 三 郎

1) **コクワガタ**臺灣に産す——臺灣の檜林で有名な太平山のすぐ下の方にあつた