

ありて恰も二疊紀の如き異相を呈せしものか、或は石炭紀一般に山腹乾地は如此常態なりしならんか、(G. KONZUMI)

Annularia gallioides	Sphenopteris Zeillerii
Sphenopteris Goldenbergii	S. minutisecta
Pecopteris abbreviata	Neuropteris fimbriata
Odontopteris Sternbergii	Callipteridium grandifolium
Alethopteris kansasensis	Alethopteris massillonis
Desmopteris sp nov	Taeniopteris coriacea
Taeniopteris newberryana	T. angelica
Pteridospermostrobus Stopesii	Lepidophyllum tuminatum
Cordaites nov sp	Samaropsis americana
Dicranophyllum garnettensis	Walchia piniformis
Walchia ficiformis	W. pinnata
W. frondosa	Voltzia foliosa
Ulmannia sp	Dichophyllum Mooreii

チクソン氏：— 日本産蘚類新屬 (H. N. Dixon : — Decas Generum Novarum Muscorum, in Jour. Bot. vol. 74, 1936, pp. 1-10, t. 1.)

新發見の新屬蘚類は次の如し

Macrosporiella scabriseta Dixon et Ther. (Leucodontaceae)

日 向 : 美々 津

Rigodiadephush octoblepharis Dixon (Pterobryaceae ?)

大 壱 原 山

Isotheciadelphus Sasaokai Dixon et Ther. (Lembophyllaceae)

信 州

I. variabilis Dixon et Ther.

越 中 : 肥 後

I. obtusifolius Dixon

八 甲 田 山

Ectropodon urceolatus Dixon (Fabroniaceae)

陸 前 : 越 中

Cymbifoliella Sasaokai Dixon (Entodontaceae)

仙 臺

Synodontella japonica Dixon et Ther (Entodontaceae)

東 京 : 井 ノ 頭

(R. TOYAMA)

アルレン氏：— 銹菌の有性生殖, (R. F. ALLEN : — A Cytological