

C. micrantha CHIPP., 土黨參(考) *Campanumoea javanica* BL., 半邊蓮(考) *Lobelia radicans* THUNB., 銅錘玉帶草(考) *Pratia begonifolia* LINDL. (救) とは明周定王朱櫛救荒本草農政全書本。(考) とは清吳其濬植物名實圖考の略。 (北村四郎)

ボロフ氏：— **ハシバミ属の話と分類** (E. G. BOBROV., Histoire et systématique du genre *Corylus* in *Sovietskaia Botanica* 1936 No. 1 pp. 11-39).

主として露文で書いてあるが重要な分類學的の事柄は羅典文である。ハシバミ属 19 種について系統を示してある。其の各種は羅典文の検索表がついてゐる。

Subgenus 1. **Acanthochlamys** (SPACH) BOBR.

1. *Corylus ferox*. WALL. 2. *C. tibetica* BATAL.

Subgenus 2. **Phyllochlamys** BOBR.

Sectio **Diphyllon** BOBR. 3. *C. colurna* L. 4. *C. avellana* L.

5. **C. Potanini** BOBR. sp. nov. ex China, prov. Sutchuen. (圖入)

6. *C. heterophylla* FISCHER **オホハシバミ**. var. *Thunbergii* BLUME この中に var. *yezoensis* KOIDZ. と var. *japonica* KOIDZ? *C. yezoensis* NAKAI を異名として入れてゐる。

7. *C. americana* WALT.

Sectio **Monophyllon** BOBR. 8. *C. maxima* MILL. 9. *C. pontica* C. Koch. 10. *C. colchica*.

Subgenus 3. **Siphonochlamys** BOBR.

11. *C. yunnanensis* A. CAMUS. 12. *C. papyracea* HICKEL. 13. *C. chinensis* FRANCHET

14. *C. Fargesii* C. K. SCHN. 15. *C. manshurica* MAXIM. **オホバツノハシバミ**

16. *C. brevituba* KOM. 17. *C. californica* BOSE 18. *C. Sieboldiana* BLUME **ツノハシバミ**

この中に *C. rostrata* var. *mitis* MAXIM. コツノハシバミ及び *C. hallaisanensis* Nakai ツボハシバミを異名として入れてゐる。 19. *C. cornuta* MARSH.

Hibrids

1. *C. avellana* × *colurna* REDER. 2. *C. avellana* × *chinensis* REHDER 3. *C. avellana* × *tibetica* RHDER. (北村四郎)

張肇騫氏： **中國菊科新種類** (Chao-chien CHANG, *Compositae Novae Sinensis* in *Sinensia* Vol. 6. No. 5 1935 pp. 541-550).

本論文は支那の菊科の新種を發表せるもので斷片的報告である。内容は標品を見ぬ筆者には云々する事をせぬが既に古き名あるにもかゝらず、同名を重複さして用ひるのは頗る遺憾である。其の種名と産地を擧ぐれば、*Aster simplex* CHANG (抄録者曰

〈 non EATON, nec WILLD.) — 四川省、*Anaphalis tenuissima* CHANG — 西部支那、*Anaphalis conferta* CHANG — 四川省、雲南省、*Anaphalis corymbifera* CHANG. — 上部ビュルマ、*Anaphalis virens* CHANG — 西南四川省、西雲南省、*Anaphalis bicolor* (FRANCHET) CHANG var. *longifolia* CHANG — 雲南省、*Anaphalis Bulleyana* (J. F. JEFFREY) CHANG, *Ainsliaea crassifolia* CHANG — 雲南省 (北村四郎)

張肇騫氏：— 中國菊科之新種 (Chao-chien CHANG, *Compositae Novae Sinesis* in Bulletin of the Fan Memorial Institute of Biology Botany Vol. VI No. 2. 1935 pp. 43-69).

本論文も斷片的菊科新種の報告である。

Aster (Boltonia) angustifolius CHANG (抄録者曰く non JACQ., non LINDLEY) — 浙江省、*Aster (Diplopappus) brachyphyllus* CHANG — 四川省、*Aster fuscescens* var. *scaberoides* CHANG — 西藏、*Aster (Diplopappus) nitidus* CHANG — 四川省、*Senecio (Synotis) calcocephalus* CHANG — ビュルマ、雲南省、*Senecio (Jacobaea) coriaceisquamus* CHANG — 雲南省、*Senecio homogynophyllus* var. *subumbellatus* CHANG — 四川省、*Senecio (Jacobaea) multilobus* CHANG — 雲南省、*Senecio nodiflorus (Jacobaea)* CHANG — 雲南省、*Senecio (Synotis) densiserratus* CHANG — 四川省、*Senecio (Synotis) Pseudo-alatus* CHANG — 上部ビュルマ、*Senecio (Jacobaea) rosuliferus* CHANG — 四川省、*Senecio (Jacobaea) septilobus* CHANG — 四川省、*Senecio (Jacobaea) trinerviis* CHANG — 雲南省、*Ligularia chimiliensis* CHANG — 上部ビュルマ、*Ligularia confertiflora* CHANG 西部雲南省、*Ligularia parvifolia* CHANG — 雲南省、*Ligularia pterodonta* CHANG — 西部雲南省、*Ligularia tenuicaulis* CHANG — 東部西藏、*Jurinea (Subacaules) crispo-undulata* CHANG — 西藏、*Hieracium runcinatifolium* CHANG (= *Crepis scaposa* CHANG). (北村四郎)

張肇騫氏：中國菊科植物之觀察 (Chao-chien CHANG, *Observations on the Compositae of China* in *Sinensia* Vol. 4 No. 8 1934 pp. 225-229).

本論文に發表せる新種。

Ainsliaea (Scaposae) cleistogama CHANG — 廣東省、*Ainsliaea (Scaposae) rubrinervis* CHANG — 四川省、*Ainsliaea pteropoda* var. *apteroides* CHANG — 雲南省、*Ainsliaea Henryi* var. *ovatifolia* CHANG — 雲南省、*Cremanthodium hederacifolium* (DÜMMER) CHANG (= *Gerbera hederacifolia* DÜMMER). (北村四郎)

張肇騫氏：— 中國菊科新種 (Chao-Chien CHANG, *Compositae Novae Si-*