

〈 non EATON, nec WILLD. ) — 四川省、*Anaphalis tenuissima* CHANG — 西部支那、*Anaphalis conferta* CHANG — 四川省、雲南省、*Anaphalis corymbifera* CHANG. — 上部ビュルマ、*Anaphalis virens* CHANG — 西南四川省、西雲南省、*Anaphalis bicolor* (FRANCHET) CHANG var. *longifolia* CHANG — 雲南省、*Anaphalis Bulleyana* (J. F. JEFFREY) CHANG, *Ainsliaea crassifolia* CHANG — 雲南省 (北村四郎)

張肇騫氏：— 中國菊科之新種 (Chao-chien CHANG, *Compositae Novae Sinesis* in Bulletin of the Fan Memorial Institute of Biology Botany Vol. VI No. 2. 1935 pp. 43-69).

本論文も斷片的菊科新種の報告である。

*Aster (Boltonia) angustifolius* CHANG (抄録者曰く non JACQ., non LINDLEY) — 浙江省、*Aster (Diplopappus) brachyphyllus* CHANG — 四川省、*Aster fuscescens* var. *scaberoides* CHANG — 西藏、*Aster (Diplopappus) nitidus* CHANG — 四川省、*Senecio (Synotis) calcocephalus* CHANG — ビュルマ、雲南省、*Senecio (Jacobaea) coriaceisquamus* CHANG — 雲南省、*Senecio homogynophyllus* var. *subumbellatus* CHANG — 四川省、*Senecio (Jacobaea) multilobus* CHANG — 雲南省、*Senecio nodiflorus (Jacobaea)* CHANG — 雲南省、*Senecio (Synotis) densiserratus* CHANG — 四川省、*Senecio (Synotis) Pseudo-alatus* CHANG — 上部ビュルマ、*Senecio (Jacobaea) rosuliferus* CHANG — 四川省、*Senecio (Jacobaea) septilobus* CHANG — 四川省、*Senecio (Jacobaea) trinerviis* CHANG — 雲南省、*Ligularia chimiliensis* CHANG — 上部ビュルマ、*Ligularia confertiflora* CHANG 西部雲南省、*Ligularia parvifolia* CHANG — 雲南省、*Ligularia pterodonta* CHANG — 西部雲南省、*Ligularia tenuicaulis* CHANG — 東部西藏、*Jurinea (Subacaules) crispo-undulata* CHANG — 西藏、*Hieracium runcinatifolium* CHANG (= *Crepis scaposa* CHANG). (北村四郎)

張肇騫氏：中國菊科植物之觀察 (Chao-chien CHANG, *Observations on the Compositae of China* in *Sinensia* Vol. 4 No. 8 1934 pp. 225-229).

本論文に發表せる新種。

*Ainsliaea (Scaposae) cleistogama* CHANG — 廣東省、*Ainsliaea (Scaposae) rubrinervis* CHANG — 四川省、*Ainsliaea pteropoda* var. *apteroides* CHANG — 雲南省、*Ainsliaea Henryi* var. *ovatifolia* CHANG — 雲南省、*Cremanthodium hederacifolium* (DÜMMER) CHANG (= *Gerbera hederacifolia* DÜMMER). (北村四郎)

張肇騫氏：— 中國菊科新種 (Chao-Chien CHANG, *Compositae Novae Si-*