

雑 録

琉球諸島産シヤウジャウバカマ新品

小 泉 源 一

予大正十二年六月廿六日より七月九日に到る間西表島第一回の滞在をせし時に、八重山炭坑主河野吉次氏に大なる援助を得しを以て、全島に発見せしシヤウジャウバカマの一品に全氏の紀念の爲め *Heloniopsis Kawanoi* Koidz. と命ぜしは、其七月七日の事なりしも今に到るまで發表せず、唯故河野八重山炭坑主の紀念帖内に圖説せしのみにて、全氏も其發表を見ずして物故せられしは實に遺憾である、謹みて河野故八重山炭坑主に大なる感謝の意を表す。

Sugerokia Kawanoi Koidz. nov. sp.

Heloniopsis Kawanoi Koidz.

Rhizoma breve gracile erectum. Folia omnia radicalia 8-25, anguste spatulata 2-8 cm longa, 3-9 mm lata, apice acuta vel obtuse acuta, et argute mucronato-aristata, infra medium longe attenuato-decurrentia, interdum valde angustissime attenuata, apicem versus triplinervia vel pedatim triplinervia vel pedatim quintaplinervia, integerrima, tenue membranacea. Scapus 14 cm longus glaberrimus gracilis foliis reductis scariosis lanceolatis glabris tenuibus ochraceis 10-14 mm longis praeditus. Flores ad apicem scapi 2 gerentes ochroleuci 6 mm longi, pedicellis brevibus 3-6 mm longis, bracteolis lanceolatis scariosis tenuibus 7-9 mm longis. Tepala perianthii obovata obtuse acuta 6 mm longa 3 mm lata. Stamina inclusa.

Nom. Jap. *Ko-shojobakama*

Hab. Loochoo: insula Irumti, ad Urautigawa (lg. G. Koidzumi! 6, Jul. 1923.)

Species dicata in onorem KITIJI KAWANO.

Sugerokia leucantha Koidz. nov. sp.

Heloniopsis leucantha Koidz.

Rhizoma crassum suberectum. Folia omnia radicalia 9-10, oblanceolata 10-18 cm longa, 15-27 mm lata, apice breviter subito acutata ad summis aristis minutis instructa versus basin longe cuneato-attenuata, sessilia, integra, membranacea, glaberrima. Scapus 7-27 cm longus erectus basi foliis minoribus 5-7 cm longis lineari-oblanceolatis multo angustioribusque praeditus, superne foliis scariosis fere squamiformibus pluribus instructus, superne floribus 7-20 racemosis gerens; pedicellis 10-14 mm longis glabris; floribus albis vel candidis 18-20 mm longis. Tepala perianthii 6 spatulato-oblanceolata 18-20 mm longa, 4 mm lata, apice obtuse acuta, basin versus attenuata. Stamina 6 tepalum valde excerta. Ovarium glabrum.

Nom. Jap. *Oh-siro-shojobakama*

Hab. Loochoo : insula Utchina, Kunchan, Hetona, Abagawa, Yonagawa; Katena : Taniwadake, Ajagawa (lg. T. SONOHARA !)

沖繩産の蘭科二新種

大井次三郎

Goodyera subuniflora OHWI sp. nov.

Pumila basi repens, cum scapo ca. 4–6 cm alta, caule 1.5 mm diam. in sicco, incrassato, apice subtrifoliato, glabro, foliis ovatis subcarnosis viridulis subtus parum pallidioribus immaculatis (?), subquinqnervis laxè reticulatovenulosis glabris integris, 15–22 mm longis 10–15 mm latis, basi rotundatis vel vix cordatis, apice acutis, petiolis 7–12 mm longis infra medium vaginato-dilatatis, scapo terminali 2–3 cm alto unibracteato confervoideopiloso erecto, bractea linearì acuminata rubescente 10–12 mm longa adpressa, racemis reducte unifloris, bractea e basi oblonga confervoideociliata sursum lineariattenuata acuminata 12–15 mm longa membranacea, flore ascendente, ovario glabro 8 mm longo excepto, 6–7 mm longo glabro, sepalis oblongoovatis obtusulis uninervis, petalis lateralibus cum sepalo mediali connivente galeam ascendentem formantibus ca. 6 mm longis falcatospathulato-obovatis uninervis obtusis, labello ovatodeltoideo 6 mm longo glabro suberecto, e basi inflata intus papillosa sursum angustato obtusulo vix lamellato 7-nervato margine involuto, basi gynostemio adnato, gynostemio 5 mm longo.—Species insignis habitu humili, racemis reducte subunifloris.

Nom. Jap. Ichige-shusuran.

Hab. Riukiu : Guiku, ins. Okinawa (Y. TAIRA—Typus ! in Herb. Imper. Univers. Kyoto.).

Zeuxine Hoshiana OHWI sp. nov.

Caule cum scapo 30 cm alto erecto laxè foliato tereti ca. 4 mm diam. in sicco, glabro, foliis ovatis glabris, in sicco rubescentibus 6–7 cm longis ca. 4 cm latis integris trinerviis et longitudinaliter ac transverse venulosis, apice abrupte acutis, basi rotundatis, submembranaceis, petiolis 2.5–3 cm longis supra medium usque ad basin dilatatovaginatatis, scapo 10 cm longo bibracteato confervoideopiloso, bracteis ovatodeltoideis membranaceis acuminatis parce pilosis basi antice leviter connatis breviter vaginantibus, laxis, racemis ca. 7 cm longis ca. 10-floris laxiusculis, bracteis anguste ovatotriangulatis uninervis parce pilosis, ovario piloso ca. 1 cm longo ascendente subaequilongis rubrosuffusis, floribus 7–9 mm longis, sepalis inferne extus parce pilosis, dorsali ovato obtuso plicato 6 mm longo cum petalis aequilongis conniventibus galeam formante uninervi, lateralibus falcatooblongoovatis 6–7 mm longis obtusis trinervis planis, petalis late falcatoovatis uninervis glabris obtusissimis,