

Nom. Jap. *Oh-siro-shojobakama*

Hab. Loochoo : insula Utchina, Kunchan, Hetona, Abagawa, Yonagawa; Katena : Taniwadake, Ajagawa (lg. T. SONOHARA !)

## 沖繩産の蘭科二新種

大井次三郎

**Goodyera subuniflora** OHWI sp. nov.

*Pumila* basi repens, cum scapo ca. 4–6 cm alta, caule 1.5 mm diam. in sicco, incrassato, apice subtrifoliato, glabro, foliis ovatis subcarnosis viridulis subtus parum pallidioribus immaculatis (?), subquinqnervis laxe reticulatovenulosis glabris integris, 15–22 mm longis 10–15 mm latis, basi rotundatis vel vix cordatis, apice acutis, petiolis 7–12 mm longis infra medium vaginato-dilatatis, scapo terminali 2–3 cm alto unibracteato confervoideopiloso erecto, bractea linearis acuminata rubescente 10–12 mm longa adpressa, racemis reducte unifloris, bractea e basi oblonga confervoideociliata sursum lineariattenuata acuminata 12–15 mm longa membranacea, flore ascendente, ovario glabro 8 mm longo excepto, 6–7 mm longo glabro, sepalis oblongoovatis obtusulis uninervis, petalis lateralibus cum sepalo mediali connivente galeam ascendentem formantibus ca. 6 mm longis falcatospathulato-obovatis uninervis obtusis, labello ovatodeltoideo 6 mm longo glabro suberecto, e basi inflata intus papillosa sursum angustato obtusulo vix lamellato 7-nervato margine involuto, basi gynostemio adnato, gynostemio 5 mm longo.—Species insignis habitu humili, racemis reducte subunifloris.

Nom. Jap. Ichige-shusuran.

Hab. Riukiu : Guiku, ins. Okinawa (Y. TAIRA—Typus ! in Herb. Imper. Univers. Kyoto.).

**Zeuxine Hoshiana** OHWI sp. nov.

Caule cum scapo 30 cm alto erecto laxe foliato tereti ca. 4 mm diam. in sicco, glabro, foliis ovatis glabris, in sicco rubescentibus 6–7 cm longis ca. 4 cm latis integris trinerviis et longitudinaliter ac transverse venulosis, apice abrupte acutis, basi rotundatis, submembranaceis, petiolis 2.5–3 cm longis supra medium usque ad basin dilatatovaginatatis, scapo 10 cm longo bibracteato confervoideopiloso, bracteis ovatodeltoideis membranaceis acuminatis parce pilosis basi antice leviter connatis breviter vaginantibus, laxis, racemis ca. 7 cm longis ca. 10-floris laxiusculis, bracteis anguste ovatotriangulatis uninervis parce pilosis, ovario piloso ca. 1 cm longo ascendente subaequilongis rubrosuffusis, floribus 7–9 mm longis, sepalis inferne extus parce pilosis, dorsali ovato obtuso plicato 6 mm longo cum petalis aequilongis conniventibus galeam formante uninervi, lateralibus falcatooblongoovatis 6–7 mm longis obtusis trinervis planis, petalis late falcatoovatis uninervis glabris obtusissimis,

margine inferne valde dilatatis, labello 8 mm longo e flore paullo exserto glabro, e basi subsaccata orbiculata inflata intus supra basin utrinque retrosobicallosa apice abrupte producto in laminam late obovatam ca. 4 mm longam reflexam apice bilobo-emarginatam, margine integram, gynostemio ca. 3 mm longo, rostello erecto majusculo, profunde bifido.—Proxima *Z. fluvida* FUKUYAMA, sed bene differt, ovario, sepalisque exterioribus pilosis.

Nom. Jap. Oni-shusuran.

Hab. Riukiu: Guiku, ins. Okinawa (D. HOSHII—Typus! in Herb. Imper. Univers. Kyoto.).

イチゲシユスラレ (*Goodyera subumiflora* OHWI) は平芳久氏が沖繩島越來で採集された珍品で花序が退化して一莖殆ど常に一花と成つて居るのが著しい特徴である。

又オニシユスラン (*Zeuxine Hoshiana* OHWI) は同じく越來で星大吉氏が採集されたもの、此の属のものにしては花が大きく、台灣産の *Z. fluvida* FUKUYAMA に似て居るが子房、萼の外面等に毛茸があるので直ちに區別が出来る。

## 新種 コメバオトギリサウ

大井次三郎

***Hypericum nokoense* OHWI sp. nov.**

Perenne caespitosum usque ad 10 cm altum, caule e basi procumbente ramosa erectis tenuibus teretibus aequidistanter multifoliatis, foliis patentibus crassiusculis ovatis vel oblongis 4–6 mm longis 2–2.5 mm latis, supra intense viridibus, costis leviter impressis, subtus eximie glaucescentibus, apice obtusissimis vel rotundatis vel obtusis, basi rotundata sessilibus, subtus punctis nigris tantum obsitis, quam internodia subaequilongis, floribus terminalibus ad apicem caulis plerumque ternis, lateralibus breviter pedunculatis, pedicellis subnullis, bracteis linearilanceolatis ca. 3.5 mm longis acutis nigropunctatis atque striolatis, apice saepe recurvis, petalis 10 mm longis anguste oblongis obtusis fere impunctatis, ovario ovato trilocolato, stylis 3 liberis tenuibus anthesi patentibus 4 mm longis, stigmatibus punctiformibus.—*H. Nagasawae* HAYATA paulo simile, a quo tamen diversum foliis minoribus subtus ex toto nigropunctatis, et punctis pellucidis destitutis, floribus minoribus.

Nom. Jap. Komeba-otogiriso.

Hab. Formosa: m. Nokogoe (J. OHWI n. 2951—Typus! in Herb. Imper. Univers. Kyoto.), do. (J. OHWI n. 2958).

台灣能高越の産、葉が小形で厚く、葉裏には黒點のみを散布し、苞並に萼裂片は鋭頭で、後者は先端が少しく外反するのが特徴である。