

新種 オホバナシホガマ

大井次三郎

先頃小泉先生から、京城帝國大學の石戸谷勉氏採集の面白いシホガマの一品があるから研究して見る様にとの御指示があつて、その標本を御貸與に成られた、見た所莖と云ふ様な部分がなく、葉は長さ一尺位で叢生して居るにもかかはらず花莖が出ず、花は根頸から繖状に數個出て相當大形な頗る特徴のある植物であつた、早速調査して見た所 MAXIMOWICZ によるとハンクワイシホガマやオニシホガマ同様に *Sceptra* 節のもので蒙古方面に分布する *Pedicularis Artselaeri* MAXIM. に類似した新種である、小泉先生に御相談の上新種として記載發表する、石戸谷氏に従へば朝鮮京畿道の天磨山の山側溪流の畔の草地に群生して居て、花はシホガマギクと同様の淡紅色であると、氏にちなんで *Pedicularis Ishidoyana* KOIDZ. et OHWI とする。

263) *Pedicularis Ishidoyana* KOIDZ. et OHWI sp. nov. (*Sceptra*).

Acaulis parce pubescens, rhizomate brevi, collo squamis membranaceis paucis cincto, foliis omnibus radicalibus paucis ca. 30 cm longis late lanceolatis vel anguste oblongoovatis longe petiolatis pinnatis acutiusculis 3-5 cm latis, pinnis pluribus basi latiuscula sessilibus oblongoovatis vel angustioribus acutiusculis mucronatoserratis, superioribus basi decurrentibus, racemo abbreviato subradicali fere usque ad 1 cm longo 3-7-floro, bracteis paucis quam flores brevioribus longe petiolatis profunde serratis linearibus, pedicellis calycem vulgo 2-3-plo superantibus, calycis tubo tubuloso (in fructu ovato) 10-13 mm longo, dentibus quam tubus subaequilongis linearibus serrulatis, corolla recta 4.5 cm longa glabra rubra, tubo 2 cm longo angusto, intus latere utrinque pubescente, galea erecta sursum leviter incurva crost-rata edentula 4 mm lata apice rotundata, margine superne albolanata, labio galeam aequante obovatocuneato ciliato trifido, lobis subrotundatis, staminibus inclusis, filamentis glabris, antheris ellipticis glabris contiguis 3mm longis basi apiculatis, ovario conico glabro, stylo glabro filiformi, stigmate minuto capitato, capsula calycis tubo incluso oblique ovato erecto.——A *P. Artselaeri* MAXIM. planta mongholica, cui affinis, differt floribus majoribus, corollae galea rotundata nec acutiuscula, labio ciliato, filamentis glabris.—— Nom. Jap. *Obana-shiogama*.

Hab. Korea media: m. Tenmasan in Keiki (T. ISHIDOYA.——typus in Herb. Imper. Univers. Kyoto.).